

MAALOX REFLURAPID

Dispositivo medico

Blocca il reflusso
Riduce il bruciore
Sospensione orale
Senza Glutine
Senza Lattosio

INDICAZIONI D'USO

MAALOX REFLURAPID è un dispositivo medico ad azione meccanica a base di Sodio Alginato, bicarbonato di sodio, sodio carbonato e calcio carbonato, formulato per svolgere 3 azioni sinergiche: bloccare il reflusso acido, ridurre il bruciore e proteggere la mucosa dell'esofago.

MAALOX REFLURAPID dispositivo medico è indicato per il trattamento del reflusso gastro-esofageo al fine di ridurre i sintomi ad esso correlati, come ad esempio: bruciore, pirosi gastrica in gravidanza, esofagite da reflusso, rigurgito acido, cattiva digestione, sintomi notturni da reflusso, tosse e infiammazione laringo-faringea.

COME AGISCE

MAALOX REFLURAPID dispositivo medico, grazie all'azione dell'Alginato di Sodio e dei carbonati in esso contenuti, può iniziare ad agire in 3 minuti. A contatto con l'acido dello stomaco, l'alginato di sodio reagisce formando un gel mentre i carbonati rilasciano anidride carbonica permettendo al gel di galleggiare e di formare così un tappo che impedisce meccanicamente la risalita dei succhi gastrici verso l'esofago. La presenza del bicarbonato contribuisce inoltre a ridurre l'iperacidità di stomaco.

Grazie alle sue peculiari caratteristiche, esplica un effetto barriera che protegge la mucosa dell'esofago dall'aggressione degli acidi, favorendone la rigenerazione e aiutando a prevenire il rischio di ricadute di esofagite da reflusso.

La sua formulazione, caratterizzata da uno specifico bilanciamento tra l'alginato di sodio e i carbonati, favorisce una rapida azione.

COMPOSIZIONE

Sodio Alginato, Bicarbonato di Sodio, Sodio Carbonato, Calcio Carbonato, acqua depurata, aroma, acido poliacrilico, etilparabene, metil-p-idrossibenzoato di sodio, saccarina sodica

MODO D'USO

Adulti e bambini al di sopra dei 12 anni: 1 o 2 bustine (10 ml cadauna) dopo i pasti principali e al momento di coricarsi. Agitare prima dell'uso.

Bambini al di sotto dei 12 anni: deve essere somministrato solo su consiglio medico. Per le modalità di assunzione del prodotto seguire attentamente le indicazioni raccomandate dal medico.

AVVERTENZE

Non utilizzare in caso di grave insufficienza renale. Non utilizzare in caso di ipersensibilità nei confronti dei componenti. In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare il medico. Il prodotto può interferire con l'assorbimento di medicinali ad uso orale. Si consiglia pertanto di consultare il medico in caso di assunzione contemporanea di medicinali ad uso orale, che devono in ogni caso essere somministrati ad una distanza di almeno 2 ore. Qualora non si dovesse notare alcun miglioramento dopo 7 giorni di trattamento, si consiglia di consultare il medico. Il prodotto può causare una sensazione di gonfiore. Il rispetto delle modalità d'uso riportate riduce la probabilità che accada. Questo prodotto contiene una quantità di sodio pari a circa 100 mg (4,4 mmoli) e di calcio pari a circa 36 mg (0,9 mmoli) per bustina (10 ml). Consultare il medico nel caso in cui si segua una dieta povera di sale, come ad esempio in caso di ipertensione, problemi cardiaci, epatici e renali ed in caso di ipercalcemia, nefrocalcinosi e calcoli renali ricidivi contenenti calcio.

CONSERVAZIONE:

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione e sulle bustine. Conservare ad una temperatura compresa fra gli 8°C ed i 25°C, al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore. Non refrigerare.



Biofarma – Via Castelliere 2 – 33036 Mereto di Tomba (UD)

Distributore: Opella Healthcare Italy S.r.l – Viale L.Bodio, 37/B – IT-20158 Milano



0373 DISPOSITIVO MEDICO

Bustine monodose da 10 ml

Data ultima revisione: Dicembre 2021